

Médico Gastroenterologista

PORTUGUÊS

01) Assinale a alternativa em que a palavra **se** desempenha a função de índice de indeterminação de sujeito:

- a) Alugam-se imóveis.
- b) Necessita-se de professores eventuais.
- c) Lia olhou-se no espelho.
- d) Se chover, tire as roupas do varal.
- e) Não sei se digo a verdade.

02) Assinale a alternativa em que a palavra **que** assume o valor morfológico de advérbio:

- a) Que perto fica a sua escola!
- b) Tem que haver um lugar para ele.
- c) Eu é que sei como dói a perda de alguém.
- d) Apresse-se que quero partir.
- e) Que dias mais tristes, que dias sem vida estes!

03) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da crase:

- a) Adoro arroz à grega.
- b) Deu o presente à professora.
- c) Ele nunca foi à Itália.
- d) Estava sempre feliz à cantar.
- e) Fui à casa de Helena.

04) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta onze letras e nove fonemas:

- a) Tecnocracia.
- b) Civilização.
- c) Burburinhar.
- d) Duplicidade.
- e) Carrocinhas.

05) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente grafadas:

- a) Cisão, impingie, xachim, lêndea.
- b) Cisão, impingem, xaxim, lêndea.
- c) Cizão, impingem, chaxim, lêndea.
- d) Cizão, impingem, chaxim, lêndia.
- e) Cisão, impingie, xaxim, lêndia.

06) Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal:

- a) A mãe, a filha e a neta acreditam em duendes.
- b) Vossas Senhorias se equivocaram.
- c) Os Estados Unidos desprezam os outros países.
- d) Era agosto e a rainha comemorava seu aniversário.
- e) São meio dia e meia.

07) Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância nominal:

- a) Estou quites com o serviço militar.
- b) Eles estavam sempre alerta.
- c) Há menos mulheres aqui hoje.
- d) As crianças sempre falavam manso.
- e) As próprias mães foram à delegacia.

08) Indique a alternativa em que o termo grifado expresse circunstância de dúvida:

- a) **Amanhã** irei me matricular no curso.
- b) Estou **longe** de casa.
- c) Ele está cada vez **mais** inteligente.
- d) **Provavelmente** chegará para o almoço.
- e) **Realmente** ele é um bom professor.

09) "Este vinho é _____ do Uruguai."
"Espero que elas _____ comigo."
"O diretor _____ a solicitação de dispensa médica do funcionário."

"Ela fez uma _____ minuciosa do bandido ao delegado."

A alternativa que preenche corretamente as lacunas acima é:

- a) Procedente, viagem, deferiu, descrição.
- b) Procedente, viagem, diferiu, descrição.
- c) Precedente, viagem, deferiu, descrição.
- d) Precedente, viagem, diferiu, descrição.
- e) Procedente, viagem, deferiu, descrição.

10) Assinale a alternativa que apresenta o vício de linguagem conhecido por barbarismo:

- a) Sua saia sujou.
- b) Ele vai vim aqui.
- c) A cadela da sua irmã foi passear no parque?
- d) Pagou quinze por cada.
- e) Subiu lá em cima no décimo andar.

MATEMÁTICA

11) A alternativa que contem o décimo termo da PG (2, -4, 8,...), é:

- a) -512.
- b) 512.
- c) 1024.
- d) -1024.
- e) -2048.

12) Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e identifique as sentenças verdadeiras.

- I. $\{-1, 0, 1\}$ pertencem ao conjunto dos Números Naturais.
- II. A raiz quadrada de 4 é um Número Irrracional.
- III. $\{-4\}$ pertence ao conjunto dos números racionais.

- a) Apenas I é verdadeira.
- b) Apenas II é verdadeira.
- c) Apenas III é verdadeira.
- d) Apenas I e II são verdadeiras.
- e) Apenas II e III são verdadeiras.

13) Em uma proporção, sabe-se que **a** está para 5, assim como **b** está para 3 e que $a + b = 64$. Nessas condições, o valor que representa o dobro de **a** é:

- a) 24.
- b) 48.
- c) 40.
- d) 64.
- e) 80.

14) Sabendo que o tanque de combustível de uma caminhonete tem capacidade para 75 litros de combustível, é correto afirmar que isso equivale, em centímetros cúbicos, a:

- a) 75.000 cm³.
- b) 7.500 cm³.
- c) 750 cm³.
- d) 75 cm³.
- e) 7,5 cm³.

15) Sobre as sentenças matemáticas abaixo:

- I - Todo ângulo reto tem medida igual a 180°.
 - II - Ângulo reto é aquele que mede 90°.
 - III - Ângulo raso é aquele que mede menos de 90°
- Estão corretas apenas as afirmações:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Sobre a prevenção clínica das doenças renais, são procedimentos corretos, exceto:

- a) O uso isolado de creatinina para avaliação da função renal não deve ser utilizado, pois somente alçará valores acima do normal após a perda de 50-60% da função renal.
- b) Todo paciente pertencente ao chamado grupo de risco, mesmo que assintomático, basta ser avaliado anualmente com exame de urina (fita reagente ou urina tipo 1) e creatinina sérica.
- c) A filtração glomerular, estimada pela depuração de creatinina, deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano nos pacientes de risco no estágio 0 e 1 e semestralmente no estágio 2 da Doença Renal Crônica (DRS).
- d) Os pacientes com lesão renal com insuficiência renal severa apresentam risco maior de deterioração da função renal e devem obrigatoriamente ser encaminhados ao nefrologista.
- e) O diagnóstico da DRC baseia-se na identificação de grupo de risco, presença de alterações de sedimento urinário (microalbuminúria, proteinúria, hematuria e leucocitúria) e na redução da filtração glomerular avaliado pelo clearance de creatinina.

17) Na consulta médica, na avaliação inicial da pessoa com HAS, é incorreto afirmar:

- a) O objetivo inclui identificar outros fatores de risco para DCV, avaliar a presença de lesões em órgãos-alvo (LOA) e considerar a hipótese de hipertensão secundária.
- b) O processo de educação em saúde estabelecido entre o médico e a pessoa deve ser contínuo e iniciado nessa primeira consulta.
- c) Neste momento, é fundamental investigar a sua história, realizar o exame físico e solicitar exames laboratoriais, que contribuirão para o diagnóstico, a avaliação de risco para DCV e a decisão terapêutica.
- d) Neste momento, não deve ser dada atenção especial às síndromes clínicas de descompensação funcional de órgão-alvo.
- e) São consideradas síndromes clínicas de descompensação funcional de órgãos-alvo a insuficiência cardíaca, angina de peito, infarto do miocárdio prévio, episódio isquêmico transitório ou acidente vascular cerebral prévios, condições também consideradas para a decisão terapêutica.

18) Sobre a rotina complementar mínima para pessoa com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), assinale a alternativa correta:

- I- Solicitar eletrocardiograma, pois ele é razoavelmente sensível para demonstrar repercussões miocárdicas da hipertensão, como sobrecarga de ventrículo esquerdo.
 - II- Dosagem de glicose, dosagem de colesterol total, dosagem de colesterol HDL e dosagem de triglicerídeos.
 - III- Cálculo do LDL = Colesterol total - HDL - colesterol - (Triglicerídeos/5).
 - IV- Dosagem de creatinina, análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos na urina (Urina tipo 1); dosagem de potássio.
 - V- Fundoscopia.
- a) I, II, III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas a I, III e V estão corretas.
 - c) Apenas a II, III, e a IV estão corretas.
 - d) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 - e) Apenas I, III, IV e V estão corretas.

19) Entre as causas de Hipertensão Arterial Secundária, é incorreto afirmar:

- a) Entre elas estão as drogas, o álcool, o tabagismo (especialmente em grandes quantidades) e a cafeína, denominadas causas exógenas.
- b) Intoxicação química por metais pesados.
- c) Coarctação da aorta, estenose de artéria renal.
- d) Feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing, hipertireoidismo, hipotireoidismo, acromegalia.
- e) N.D.A.

20) As metas do milênio para a tuberculose (TB), pactuadas pela Organização das Nações Unidas, visam reduzir as taxas de incidência e de mortalidade em 50% até 2015. Apesar de o Brasil ser ainda um dos 22 países responsáveis por 90% dos casos de TB do mundo, até o ano de 2007, ocorreu em nosso país uma queda de 26% na incidência e de 32% na mortalidade por TB. A esse respeito, assinale a incorreta:

- a) A prevenção primária, com a investigação de contatos e atividades educativas, são metas prioritárias para a redução de casos de TB no Brasil.
- b) O diagnóstico precoce da TB e o tratamento com esquema básico (EB) descentralizado são ações relevantes na diminuição dos casos e na cadeia de transmissão da TB.
- c) A diminuição da taxa de abandono do tratamento é uma das mais difíceis ações pactuadas, pois não existe nenhum programa voltado para esta ação em especial de acompanhamento dos portadores da TB e seus contactantes.
- d) A coordenação do cuidado (promovendo interação com outros serviços/níveis de atenção) deve ser ação prioritária da Atenção Básica no controle da TB, assim como a relação estabelecida entre as redes de atenção para garantir o acesso ao tratamento e monitoramento dos casos na comunidade.
- e) As metas adotadas e definidas pelo MS e adotadas pelos Estados e Municípios quanto à investigação, diagnóstico de pelo menos 90% das ocorrências esperadas, assim como curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados, como também ações na redução do percentual de altas por abandono são prioridades nas ações de controle e prevenção da tuberculose no Brasil.

21) Qual é o agente etiológico do calazar (leishmaniose visceral)?

- a) Leishmania brasiliensis.
- b) Leishmania guyanensis.
- c) Leishmania donovani.
- e) Leishmania lainsoni.

22) São critérios maiores para o diagnóstico de febre reumática:

- a) febre, coreia e artralgia.
- b) poliartrite, elevação de VHS e coreia.
- c) artralgia, nódulos subcutâneos e febre.
- d) cardite, coreia e eritema marginado.
- e) eritema marginado, cardite e febre.

23) O tremor característico na doença de Parkinson:

- a) costuma envolver os 4 membros e é de intenção.
- b) é simétrico e de repouso.
- c) é assimétrico e de repouso.
- d) é simétrico e de intenção.
- e) é assimétrico e de intenção.

24) A medida mais importante de controle epidemiológico da dengue é o(a):

- a) isolamento dos doentes.
- b) vacinação dos não imunes.
- c) tratamento dos casos graves.
- d) diminuição da densidade de vetores.
- e) controle dos viajantes de áreas endêmicas.

25) Não constitui diretriz ou princípio fundamental do SUS:

- a) Universalidade.
- b) Centralização.
- c) Integralidade.
- d) Regionalização.
- e) Hierarquização.

26) Os distúrbios funcionais do aparelho digestivo, sobretudo a síndrome do intestino irritável e as dispepsias sem úlcera ou gastrite, representam uma grande variabilidade de queixas digestivas crônicas ou recorrentes. Assinale (V) nas que julgar verdadeira e (F) nas que julgar falsa e escolha abaixo a alternativa correta:

() Estima-se que cerca de 15 a 20% da população adulta tenha algum grau de intestino irritável, mas a maioria nunca chega a procurar ajuda médica ou se tratar.

() Dois terços dos pacientes que apresentam os distúrbios são homens;

() A prevalência desses distúrbios funcionais chega a 40% da demanda observada em consultório geral.

() Não significam distúrbio psiquiátrico ou ausência de doença, mas a expressão de um distúrbio funcional.

() Sinais e sintomas atuais ou história prévia de depressão, crises do pânico ou de conversão psicomotora diminuem a chance desse grupo de doenças;

() Antecedentes de experiências negativas e traumas emocionais podem ser causas ou marcadores importantes como história de abuso sexual ou físico (espancamento).

() São frequentes a coexistência de outras queixas e problemas crônicos ou recorrentes e que têm a mesma base causal e fisiopatológica ou os fatores psico-emocionais como agravantes ou precipitantes como lombalgias, artralgias, cefaléia ou enxaqueca crônica etc.

a) V, V, V, V, V, V, V, V.

b) F, V, V, F, V, F, V, V.

c) V, F, V, V, F, V, V, V.

d) F, F, V, V, F, V, V, V.

e) V, V, V, F, V, F, F, F.

27) Em relação a Ascite, assinale a incorreta:

a) Contagem de polimorfonucleares com cultura positiva, na ausência de foco abdominal de infecção, caracteriza a ascite neutrocítica.

b) Os achados no exame físico de eritema palmar, *flapping*, aranhas vasculares, circulação colateral tipo porta e hálito hepático sugerem ascite da cirrose hepática.

c) Paracentese com retirada de grande volume de líquido ascítico tem como principal complicação a indução de disfunção circulatória caracterizada por ativação do sistema renina-angiotensina aldosterona.

d) Pacientes com peritonite bacteriana espontânea devem ser submetidos a novo estudo do líquido ascítico 48 horas após o início antibioticoterapia, considerando-se falha terapêutica quando polimorfonucleares não reduzirem mais de 25% em relação ao exame pré-tratamento.

e) N.D.A.

28) A síndrome de Zollinger-Ellinson é fortemente suspeita quando o paciente apresenta:

a) Hematêmese persistente.

b) Úlcera gástrica com derrame pleural.

c) Úlcera gástrica associada a dor lombar.

d) Úlceras em diferentes graus de cicatrização.

e) N.D.A.

29) O trauma abdominal agudo afeta com maior frequência a seguinte região do trato gastrointestinal:

a) Terço médio do cólon transversal.

b) Segunda porção do duodeno.

c) Junção cardioesofágica.

d) Píloro.

e) N.D.A.

30) A colecistite enfisematosa ocorre, principalmente, em pacientes portadores de:

a) Cálculo impactado no ducto cístico.

b) Doença aterosclerótica.

c) Diabetes mal controlado.

d) Úlcera gástrica.

e) N.D.A.