

## Médico Ortopedista

### PORTUGUÊS

01) Assinale a alternativa em que a palavra **se** desempenha a função de índice de indeterminação de sujeito:

- a) Alugam-se imóveis.
- b) Necessita-se de professores eventuais.
- c) Lia olhou-se no espelho.
- d) Se chover, tire as roupas do varal.
- e) Não sei se digo a verdade.

02) Assinale a alternativa em que a palavra **que** assume o valor morfológico de advérbio:

- a) Que perto fica a sua escola!
- b) Tem que haver um lugar para ele.
- c) Eu é que sei como dói a perda de alguém.
- d) Apresse-se que quero partir.
- e) Que dias mais tristes, que dias sem vida estes!

03) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da crase:

- a) Adoro arroz à grega.
- b) Deu o presente à professora.
- c) Ele nunca foi à Itália.
- d) Estava sempre feliz à cantar.
- e) Fui à casa de Helena.

04) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta onze letras e nove fonemas:

- a) Tecnocracia.
- b) Civilização.
- c) Burburinhar.
- d) Duplicidade.
- e) Carrocinhas.

05) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente grafadas:

- a) Cisão, impingie, xachim, lêndea.
- b) Cisão, impingem, xaxim, lêndea.
- c) Cizão, impingem, chaxim, lêndea.
- d) Cizão, impingem, chaxim, lêndia.
- e) Cisão, impingie, xaxim, lêndia.

06) Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal:

- a) A mãe, a filha e a neta acreditam em duendes.
- b) Vossas Senhorias se equivocaram.
- c) Os Estados Unidos desprezam os outros países.
- d) Era agosto e a rainha comemorava seu aniversário.
- e) São meio dia e meia.

07) Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância nominal:

- a) Estou quites com o serviço militar.
- b) Eles estavam sempre alerta.
- c) Há menos mulheres aqui hoje.
- d) As crianças sempre falavam manso.
- e) As próprias mães foram à delegacia.

08) Indique a alternativa em que o termo grifado expresse circunstância de dúvida:

- a) **Amanhã** irei me matricular no curso.
- b) Estou **longe** de casa.
- c) Ele está cada vez **mais** inteligente.
- d) **Provavelmente** chegará para o almoço.
- e) **Realmente** ele é um bom professor.

09) "Este vinho é \_\_\_\_\_ do Uruguai."  
"Espero que elas \_\_\_\_\_ comigo."  
"O diretor \_\_\_\_\_ a solicitação de dispensa médica do funcionário."

"Ela fez uma \_\_\_\_\_ minuciosa do bandido ao delegado."

A alternativa que preenche corretamente as lacunas acima é:

- a) Procedente, viagem, deferiu, descrição.
- b) Procedente, viagem, diferiu, discríção.
- c) Precedente, viagem, deferiu, discríção.
- d) Precedente, viagem, diferiu, discríção.
- e) Procedente, viagem, deferiu, discríção.

10) Assinale a alternativa que apresenta o vício de linguagem conhecido por barbarismo:

- a) Sua saia sujou.
- b) Ele vai vim aqui.
- c) A cadela da sua irmã foi passear no parque?
- d) Pagou quinze por cada.
- e) Subiu lá em cima no décimo andar.

### MATEMÁTICA

11) A alternativa que contem o décimo termo da PG (2, -4, 8,...), é:

- a) -512.
- b) 512.
- c) 1024.
- d) -1024.
- e) -2048.

12) Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e identifique as sentenças verdadeiras.

- I.  $\{-1, 0, 1\}$  pertencem ao conjunto dos Números Naturais.
  - II. A raiz quadrada de 4 é um Número Irrracional.
  - III.  $\{-4\}$  pertence ao conjunto dos números racionais.
- a) Apenas I é verdadeira.
  - b) Apenas II é verdadeira.
  - c) Apenas III é verdadeira.
  - d) Apenas I e II são verdadeiras.
  - e) Apenas II e III são verdadeiras.

13) Em uma proporção, sabe-se que **a** está para 5, assim como **b** está para 3 e que  $a + b = 64$ . Nessas condições, o valor que representa o dobro de **a** é:

- a) 24.
- b) 48.
- c) 40.
- d) 64.
- e) 80.

14) Sabendo que o tanque de combustível de uma caminhonete tem capacidade para 75 litros de combustível, é correto afirmar que isso equivale, em centímetros cúbicos, a:

- a) 75.000 cm<sup>3</sup>.
- b) 7.500 cm<sup>3</sup>.
- c) 750 cm<sup>3</sup>.
- d) 75 cm<sup>3</sup>.
- e) 7,5 cm<sup>3</sup>.

15) Sobre as sentenças matemáticas abaixo:

- I - Todo ângulo reto tem medida igual a 180°.
  - II - Ângulo reto é aquele que mede 90°.
  - III - Ângulo raso é aquele que mede menos de 90°
- Estão corretas apenas as afirmações:
- a) I.
  - b) II.
  - c) III.
  - d) II e III.
  - e) I, II e III.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Sobre a prevenção clínica das doenças renais, são procedimentos corretos, exceto:

- O uso isolado de creatinina para avaliação da função renal não deve ser utilizado, pois somente alçará valores acima do normal após a perda de 50-60% da função renal.
- Todo paciente pertencente ao chamado grupo de risco, mesmo que assintomático, basta ser avaliado anualmente com exame de urina (fita reagente ou urina tipo 1) e creatinina sérica.
- A filtração glomerular, estimada pela depuração de creatinina, deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano nos pacientes de risco no estágio 0 e 1 e semestralmente no estágio 2 da Doença Renal Crônica (DRS).
- Os pacientes com lesão renal com insuficiência renal severa apresentam risco maior de deterioração da função renal e devem obrigatoriamente ser encaminhados ao nefrologista.
- O diagnóstico da DRC baseia-se na identificação de grupo de risco, presença de alterações de sedimento urinário (microalbuminúria, proteinúria, hematuria e leucocitúria) e na redução da filtração glomerular avaliado pelo clearance de creatinina.

17) Na consulta médica, na avaliação inicial da pessoa com HAS, é incorreto afirmar:

- O objetivo inclui identificar outros fatores de risco para DCV, avaliar a presença de lesões em órgãos-alvo (LOA) e considerar a hipótese de hipertensão secundária.
- O processo de educação em saúde estabelecido entre o médico e a pessoa deve ser contínuo e iniciado nessa primeira consulta.
- Neste momento, é fundamental investigar a sua história, realizar o exame físico e solicitar exames laboratoriais, que contribuirão para o diagnóstico, a avaliação de risco para DCV e a decisão terapêutica.
- Neste momento, não deve ser dada atenção especial às síndromes clínicas de descompensação funcional de órgão-alvo.
- São consideradas síndromes clínicas de descompensação funcional de órgãos-alvo a insuficiência cardíaca, angina de peito, infarto do miocárdio prévio, episódio isquêmico transitório ou acidente vascular cerebral prévios, condições também consideradas para a decisão terapêutica.

18) Sobre a rotina complementar mínima para pessoa com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), assinale a alternativa correta:

- Solicitar eletrocardiograma, pois ele é razoavelmente sensível para demonstrar repercussões miocárdicas da hipertensão, como sobrecarga de ventrículo esquerdo.
  - Dosagem de glicose, dosagem de colesterol total, dosagem de colesterol HDL e dosagem de triglicérides.
  - Cálculo do LDL = Colesterol total - HDL - colesterol - (Triglicérides/5).
  - Dosagem de creatinina, análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos na urina (Urina tipo 1); dosagem de potássio.
  - Fundoscopia.
- I, II, III, IV e V estão corretas.
  - Apenas a I, III e V estão corretas.
  - Apenas a II, III, e a IV estão corretas.
  - Apenas I, II, IV e V estão corretas.
  - Apenas I, III, IV e V estão corretas.

19) Entre as causas de Hipertensão Arterial Secundária, é incorreto afirmar:

- Entre elas estão as drogas, o álcool, o tabagismo (especialmente em grandes quantidades) e a cafeína, denominadas causas exógenas.
- Intoxicação química por metais pesados.
- Coarctação da aorta, estenose de artéria renal.
- Feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing, hipertireoidismo, hipotireoidismo, acromegalia.
- N.D.A.

20) As metas do milênio para a tuberculose (TB), pactuadas pela Organização das Nações Unidas, visam reduzir as taxas de incidência e de mortalidade em 50% até 2015. Apesar de o Brasil ser ainda um dos 22 países responsáveis por 90% dos casos de TB do mundo, até o ano de 2007, ocorreu em nosso país uma queda de 26% na incidência e de 32% na mortalidade por TB. A esse respeito, assinale a incorreta:

- A prevenção primária, com a investigação de contatos e atividades educativas, são metas prioritárias para a redução de casos de TB no Brasil.
- O diagnóstico precoce da TB e o tratamento com esquema básico (EB) descentralizado são ações relevantes na diminuição dos casos e na cadeia de transmissão da TB.
- A diminuição da taxa de abandono do tratamento é uma das mais difíceis ações pactuadas, pois não existe nenhum programa voltado para esta ação em especial de acompanhamento dos portadores da TB e seus contactantes.
- A coordenação do cuidado (promovendo interação com outros serviços/níveis de atenção) deve ser ação prioritária da Atenção Básica no controle da TB, assim como a relação estabelecida entre as redes de atenção para garantir o acesso ao tratamento e monitoramento dos casos na comunidade.
- As metas adotadas e definidas pelo MS e adotadas pelos Estados e Municípios quanto à investigação, diagnóstico de pelo menos 90% das ocorrências esperadas, assim como curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados, como também ações na redução do percentual de altas por abandono são prioridades nas ações de controle e prevenção da tuberculose no Brasil.

21) Qual é o agente etiológico do calazar (leishmaniose visceral)?

- Leishmania brasiliensis.
- Leishmania guyanensis.
- Leishmania donovani.
- Leishmania lainsoni.

22) São critérios maiores para o diagnóstico de febre reumática:

- febre, coreia e artralgia.
- poliartrite, elevação de VHS e coreia.
- artralgia, nódulos subcutâneos e febre.
- cardite, coreia e eritema marginado.
- eritema marginado, cardite e febre.

23) O tremor característico na doença de Parkinson:

- costuma envolver os 4 membros e é de intenção.
- é simétrico e de repouso.
- é assimétrico e de repouso.
- é simétrico e de intenção.
- é assimétrico e de intenção.

24) A medida mais importante de controle epidemiológico da dengue é o(a):

- isolamento dos doentes.
- vacinação dos não imunes.
- tratamento dos casos graves.
- diminuição da densidade de vetores.
- controle dos viajantes de áreas endêmicas.

25) Não constitui diretriz ou princípio fundamental do SUS:

- a) Universalidade.
- b) Centralização.
- c) Integralidade.
- d) Regionalização.
- e) Hierarquização.

26) Enquanto passeava num shopping do centro da cidade, você percebe um pedido de socorro feito pela filha de um senhor de cerca de 50 anos que acabara de desmaiar. Você prontamente se identifica como médico e corre para ajudar. Qual sua primeira providência?

- a) Checar pulso e verificar se está em parada cardiorrespiratória.
- b) Chamar o paciente em voz alta, tocando nos seus ombros.
- c) Ligar para o 192 para pedir ajuda, mencionando a necessidade de um desfibrilador.
- d) Iniciar imediatamente as compressões torácicas.
- e) Abrir imediatamente as vias aéreas e checar a respiração.

27) Quanto ao exame clínico da dor cervical, é correto afirmar:

I- Deve ser iniciado pelo exame neurológico, que visa o estudo da integridade da medula espinhal.

II- A altura da zona de insensibilidade cutânea pode revelar o nível de uma lesão medular.

III- Alterações do pulso radial, relacionadas com a rotação interna e externa da cabeça, bem como com os pulmões cheios de ar, podem revelar alterações que nos fazem pensar em compressão do plexo.

IV- A rigidez cervical pode estar presente nos graves casos de luxação interapofisária traumática.

V- Os espasmos e contraturas da musculatura anterior e posterior do pescoço atestam a veracidade da dor referida.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas II, III e V estão corretas.
- d) Apenas I e V estão corretas.
- e) Apenas I, III e IV estão corretas.

Sobre ombro, responda às questões 28 e 29.

28) O ombro é a articulação mais móvel de todas do corpo humano. É incorreto afirmar que:

- a) O trauma no ombro pode provocar fraturas no úmero, omoplata e clavícula, luxações articulares e lesões nos ligamentos de contenções.
- b) As alterações inflamatórias, comuns nesta articulação, como tendinites e bursites, que podem levar ao congelamento articular do ombro rígido (pericapsulite adesiva), são queixas frequentes, de origem traumática.
- c) A idade, profissão, nível de atividade, duração dos sintomas, o possível mecanismo de lesão ou a atividade de repetição devem constituir a história clínica.
- d) A palpação das estruturas é feita a partir da clavícula, onde há grande incidência de fraturas, que podem assim ser detectadas.
- e) O paciente deve ser examinado sempre com os dois ombros descobertos para comparação e, inicialmente, na posição em pé.

29) Quanto ao tratamento, assinale abaixo a alternativa correta.

1- As fraturas de úmero no seu 1/3 superior, detectadas pela história clínica e pelo exame, podem ser indicação cirúrgica. Radiografia se impõe.

2- As fraturas de clavícula são mais complicadas de diagnóstico. Radiografia se impõe.

3- As rupturas ligamentares e tendinosas no ombro são muito frequentes.

4- As luxações de ombro são de redução de urgência.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas 1 e 2 estão corretas.
- c) Apenas 2 e 4 estão corretas.
- d) Apenas 1 e 4 estão corretas.
- e) Apenas 1, 2 e 3 estão corretas.

30) Assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente:

Paciente adulto com seqüela de osteomielite de fêmur recebeu diagnóstico de doença crônica. A presença de \_\_\_\_\_ caracteriza uma osteomielite crônica.

- a) Fístula ativa.
- b) Sequestro ósseo.
- c) Fístula inativa.
- d) Celulite na região comprometida.
- e) Quadro infeccioso sistêmico.